ПРИЛОЖЕНИЕ
к статье «Аллельный состав локусов *Glu-1* и *Glu-3* в коллекции российских сортов яровой твердой пшеницы: анализ с помощью маркеров ПЦР»
И.Н. Леонова, А.А. Киселёва, П.Н. Мальчиков, А.И. Стасюк, А.О. Эмирсалиев




Рис. S1. Электрофореграмма продуктов амплификации с маркером BxFp†.

1 – *Triticum turanicum*; 2 – Мелянопус 69; 3 – Харьковская 46; 4 – Безенчукская 139; 5 – Алтайская нива; 6 – Безенчукская 182; 7 – Саратовская золотистая; 8 – Валентина. CS – Chinese Spring, 100+ – Step 100 long (Биолабмикс, Россия).




Рис. S2. Электрофореграмма продуктов амплификации с праймерами SB1F/SB1R (*а*) и SB4F/SB4R (*б*) к *Glu-B3a* и *GluB3d* локусам соответственно.

1 – Chinese Spring; 2 – Безенчукская 210; 3 – Харьковская 46; 4 – Саратовская золотистая; 5 – 1469д-59; 6 – 2304дт-30; 7 – Hyperno; 8 – 557 Rissa; 9 – 804д-94; 10 – Гордеиформе 1068. M – маркер длины Step 100 long (Биолабмикс). Стрелкой указаны целевые фрагменты.